

## **Памятка для населения «Алгоритм действий при присасывании клеща»**

**I. При присасывании клеща необходимо как можно раньше (в первые 1 – 2 суток) обратиться в медицинскую организацию для:**

- получения медицинской помощи по удалению клеща;
- направления на необходимые лабораторные исследования (кровь);
- назначения экстренной профилактики клещевых инфекций по результатам исследований.

Исследование клеща на наличие антигена вируса клещевого вирусного энцефалита и других возбудителей трансмиссивных инфекций для населения республики оказывается за счет личных средств граждан или в рамках программы добровольного медицинского страхования.

**II. Если у Вас сразу после укуса нет возможности обратиться в медицинскую организацию, то следует присосавшегося клеща удалить самостоятельно как можно быстрее.** Можно удалить клеща при помощи нитки, завязав узелок вокруг впившейся части клеща. Осторожно, потягивая концы нити вверх и в стороны, вытянуть его. Ранку обязательно смажьте раствором йода, спирта и т.п.

**Ни в коем случае нельзя раздавливать клеща, т.к. можно втереть возбудителя в кожу и заразиться клещевым энцефалитом.** Если нет возможности доставить клеща на исследование, его лучше сжечь.

**Присосавшегося клеща, в случае возможности его исследования, следует сохранить в плотно закрытом флаконе (предварительно положив влажный кусочек ваты или свежую травинку) с целью определения заражённости клещевыми инфекциями.** В ближайшее время необходимо обратиться в медицинскую организацию к врачу-инфекционисту или участковому терапевту, педиатру для получения медицинской консультации о проведении лабораторных исследований и профилактики инфекций, передаваемых при укусе клещом.

**III. После укуса клещом в течение месяца необходимо наблюдать за состоянием здоровья, в том числе ежедневно проводить контроль температуры тела, и при повышении температуры или появлении головной боли, слабости немедленно обратиться к врачу по месту жительства, сообщив о факте присасывания клеща.**